

プロトコルマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】 FOLFIRI+BV_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 3日
 休薬日数 11日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:25
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 01	中心静脈注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml	中心静脈 (植込カテ)		+00:00						
		1 袋 【混注不適】 1 瓶								【暗所保存】
Rp 02	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 100ml アバチン点滴静注用	局所持続注入：静脈内		+00:15						
		1 瓶 5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】								
Rp 03	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 250ml カンプト点滴静注	局所持続注入：静脈内		+01:45						
		1 袋 150 mg/m ²								
Rp 04	中心静脈注射 2時間で 大塚生食注 250ml レボホリナート点滴静注用	中心静脈 (植込カテ) 側管		+01:45						
		1 袋 200 mg/m ²								
Rp 05	化学療法(薬局混合) 15分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	局所持続注入：静脈内 *コースで		+03:45						
		1 瓶 400 mg/m ² 【冷所保存】								
										続き有り

プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコル名称 【大腸】 FOLFIRI+BV_1コース目

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 3日
 休薬日数 11日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:25
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 06	化学療法(薬局混合) 推奨ポンプで 大塚生食注 100ml 5-FU注 250mg 5ml	局所持続注入：静脈内 46時間で 1 mL 2400 mg/m ²		+04:00						
		【冷所保存】								
Rp 07	静脈内注射 生食ロック用 生食注シリンジ「テルモ」10ml	静注 1 筒 一以下余白一				+00:00				

プロトコールマスター内容

1/2

発行日時 2022/4/28 21:29

プロトコール名称 【大腸】 FOLFIRI+BV 3コース目～
同一グループ

疾患名 大腸癌
診療科 消化器・一般外科
投薬日数 3日
休薬日数 11日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
承認区分 承認済
承認日時 2022/ 4/28 21:29
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日
腎機能の値による実投与量の割合 かけない
C C r 0～25 ml/分 % G F R 0～25 mL/min %
C C r 25～50 ml/分 % G F R 25～50 mL/min %
C C r 50～75 ml/分 % G F R 50～75 mL/min %
C C r 75～100 ml/分 % G F R 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し
白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下
好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下
ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 01	中心静脈注射 15分で アロキシン点滴静注バッグ 0.75mg デキササート注射液 6.6mg 2ml	中心静脈 (植込カテ)		+00:00						
		1 袋 【混注不適】 1 瓶								【暗所保存】
Rp 02	化学療法 (薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml アパスチン点滴静注用	局所持続注入: 静脈内		+00:15						
		1 瓶 5 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】								
Rp 03	化学療法 (薬局混合) 90分で 大塚生食注 250ml カンプト点滴静注	局所持続注入: 静脈内		+00:45						
		1 袋 150 mg/m ²								
Rp 04	中心静脈注射 2時間で 大塚生食注 250ml レボホリナート点滴静注用	中心静脈 (植込カテ) 側管		+00:45						
		1 袋 200 mg/m ²								
Rp 05	化学療法 (薬局混合) 15分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	局所持続注入: 静脈内 ボースで		+02:45						
		1 瓶 400 mg/m ² 【冷所保存】								
										続き有り

プロトコールマスター内容

2/2

発行日時 2022/4/28 21:29

プロトコール名称 【大腸】 FOLFIRI+BV 3コース目～
同一グループ

疾患名 大腸癌
診療科 消化器・一般外科
投薬日数 3日
休薬日数 11日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
承認区分 承認済
承認日時 2022/ 4/28 21:29
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日
腎機能の値による実投与量の割合 かけない
C C r 0～25 ml/分 % G F R 0～25 mL/min %
C C r 25～50 ml/分 % G F R 25～50 mL/min %
C C r 50～75 ml/分 % G F R 50～75 mL/min %
C C r 75～100 ml/分 % G F R 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し
白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下
好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下
ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 06	化学療法 (薬局混合) 推奨ポンプで 大塚生食注 100ml 5-FU注 250mg 5ml	局所持続注入: 静脈内 46時間で 1 mL 2400 mg/m ²		+03:00						
		【冷所保存】								
Rp 07	静脈内注射 生食マック用 生食注シリンジ「テルモ」10ml	静注 1 筒 -以下余白-				+00:00				