

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】 FOLFIRI+Pmab

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 3日
 休薬日数 11日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:29
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)				
Rp 01	中心静脈注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキササート注射液 6.6mg 2ml	中心静脈 (植込カテ) ポート使用 1 袋 【混注不適】 1 瓶		+00:00						
										【暗所保存】
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 1回投与量1000mgを超える場合全量150ml 大塚生食注 100ml ベクティピックス点滴静注 100mg 5ml	局所持続注入: 静脈内 全量100mlに調整 1 mL 6 mg/kg 【混注不適】		+00:15						【冷&暗所保存】
Rp 03	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 250ml カンプト点滴静注	局所持続注入: 静脈内 1 袋 150 mg/m ²		+01:15						
Rp 04	中心静脈注射 2時間で 大塚生食注 250ml レボホリナート点滴静注用	中心静脈 (植込カテ) 側管 1 袋 200 mg/m ²		+01:15						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 15分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	局所持続注入: 静脈内 ボースで 1 瓶 400 mg/m ² 【冷所保存】		+03:15						続き有り

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】 FOLFIRI+Pmab

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 3日
 休薬日数 11日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:29
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)				
Rp 06	化学療法(薬局混合) 推奨ポンプで 大塚生食注 100ml 5-FU注 250mg 5ml	局所持続注入: 静脈内 46時間で 1 mL 2400 mg/m ² 【冷所保存】		+03:30						
Rp 07	静脈内注射 生食専用 生食シリンジ「テルモ」10ml	静注 1 筒 -以下余白-				+00:00				

プロトコールマスタ内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】 FOLFIRI+Pmab

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/30 09:29
投薬日数	3日	承認者	村上 賢次
休薬日数	11日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式		
有効開始日	2022/ 3/30	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C Cr 0~25 ml/分	%	G FR 0~25 mL/min	%
C Cr 25~50 ml/分	%	G FR 25~50 mL/min	%
C Cr 50~75 ml/分	%	G FR 50~75 mL/min	%
C Cr 75~100 ml/分	%	G FR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	S cr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B C の検査結果値による警告	無し		
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・ベクティピックスと生食の総量が100m l になるよう生食の用量を修正してください。
(1回投与量が1000m g を超える場合は全量150m l)

コメント (帳票・一覧)

参考文献