

プロトコールマスター内容

1/2

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】 FOLFIRI+RAM

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 3日
 休薬日数 11日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:30
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)					
Rp 01	中心静脈注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml ポララミン注 5mg 1ml	中心静脈 (植込カテ) 1 袋 【混注不適】 1 瓶 【暗所保存】 1 管 【暗所保存】		+00:00							
Rp 02	中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	中心静脈 (植込カテ) 1 瓶		+00:15							
Rp 03	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml サイラムザ点滴静注液	中心静脈 (植込カテ) 1 袋 8 mg/kg 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:20							
Rp 04	中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	中心静脈 (植込カテ) 1 瓶		+01:20							
Rp 05	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 250ml カンプト点滴静注	中心静脈 (植込カテ) 1 袋 150 mg/m ²		+01:25							
Rp 06	中心静脈注射 2時間で 大塚生食注 250ml レボホリナート点滴静注用	中心静脈 (植込カテ) 側管 1 袋 200 mg/m ²		+01:25							
											続き有り

プロトコールマスター内容

2/2

発行日時 2022/4/28 21:08

プロトコール名称 【大腸】 FOLFIRI+RAM

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 3日
 休薬日数 11日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 3/30 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 09:30
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)					
Rp 07	化学療法(薬局混合) 15分で 大塚生食注 50ml 5-FU注 250mg 5ml	中心静脈 (植込カテ) ※-ラスで 1 瓶 400 mg/m ² 【冷所保存】		+03:25							
Rp 08	化学療法(薬局混合) 推奨ポンプで 大塚生食注 100ml 5-FU注 250mg 5ml	局所持続注入: 静脈内 46時間で 1 mL 2400 mg/m ² 【冷所保存】		+03:40							
Rp 09	静脈内注射 生食ワック用 生食注シリンジ「テルモ」10ml	静注 1 筒 -以下余白-				+00:00					