

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

1/1

プロトコール名称 【食道】Nivo(adjuvant)(1-8コース)

同一グループ

疾患名 食道癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 13日
 最大クール数 8クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 2/10 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 2/10 05:47
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml オブジーボ点滴静注	点滴静注 1 瓶 240 mg/Body 【混注不適】【冷&暗保存】		+00:05					
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:35					
		-以下余白-							

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】Nivo(adjuvant)(1-8コース)

同一グループ

疾患名 食道癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 13日
 最大クール数 8クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 2/10 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 2/10 05:47
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)
infusion reactionを認めた場合は、次サイクルよりオブジーボ投与30分前に、コカール2錠の内服を考慮する。
コメント (帳票・一覧)
参考文献