

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

1/4

プロトコール名称 【食道】RT+CDDP(70)+5-FU(700)

同一グループ

疾患名 食道癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 33日
 休薬日数 23日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/4/1 有効終了日

| | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day(1) | day(2) | day(3) | day(4) | day(5) | day(6) | day(7) |
|-------|---|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rp 01 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml プロイメンド点滴静注用 150mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml デキサート注射液 6.6mg 2ml | 点滴静注 1 瓶 1 瓶 【混注不適】 【冷所保存】 2 管 【暗所保存】 1 瓶 【暗所保存】 | | 10:00 | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg | 点滴静注 1 袋 【混注不適】 | | 10:30 | | | | | | |
| Rp 03 | 点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml | 点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】 | | 10:00 | 10:00 | 10:00 | | | | |
| Rp 04 | 点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml 【危】KCL注 10mEqキット「テル」 | 点滴静注 1 袋 1 管 【混注不適】 1 キット 【暗所保存】 | | 10:45 | | | | | | |
| Rp 05 | 化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注 | 点滴静注 (側管) 全量500mlになるように生食を調整 1 mL 70 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】 | | 11:45 | | | | | | |
| | | 続き有り | | | | | | | | |

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

2/4

プロトコール名称 【食道】RT+CDDP(70)+5-FU(700)

同一グループ

疾患名 食道癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 33日
 休薬日数 23日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/4/1 有効終了日

| | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | | |

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day(1) | day(2) | day(3) | day(4) | day(5) | day(6) | day(7) |
|-------|--|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rp 06 | 静脈内注射 側注 70mg注 20mg「ト」 2ml | 静注 (側管) 1 管 【暗所保存】 | | 12:45 | | | | | | |
| Rp 07 | 点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】KCL注 10mEqキット「テル」 | 点滴静注 1 袋 1 キット 【暗所保存】 | | 12:45 | | | | | | |
| Rp 08 | 点滴注射 24時間で テルモ生食 1L 5-FU注 250mg 5ml | 点滴静注 1 袋 700 mg/m ² 【冷所保存】 | | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | | | |
| Rp 09 | 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml | 点滴静注 1 瓶 続き有り | | | | | | | 13:45 | |

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】RT+CDDP(70)+5-FU(700)

同一グループ

疾患名 食道癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 33日
 休薬日数 23日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/ 9 19:31
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day(29) | day(30) | day(31) | day(32) | day(33) | | |
|-------|---|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Rp 01 | 点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml プロイメント点滴静注用 150mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml デキサート注射液 6.6mg 2ml | 点滴静注 1 瓶 1 瓶 【混注不適】 【冷所保存】 2 管 【暗所保存】 1 瓶 【暗所保存】 | | 10:00 | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg | 点滴静注 1 袋 【混注不適】 | | 10:30 | | | | | | |
| Rp 03 | 点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml | 点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】 | | | 10:00 | 10:00 | 10:00 | | | |
| Rp 04 | 点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml 【危】KCL注 10mEqキット「テア」 | 点滴静注 1 袋 1 管 【混注不適】 1 キット 【暗所保存】 | | 10:45 | | | | | | |
| Rp 05 | 化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注 | 点滴静注 (側管) 全量500mLになるように生食を調整 1 mL 70 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】 | | 11:45 | | | | | | |
| 続き有り | | | | | | | | | | |

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】RT+CDDP(70)+5-FU(700)

同一グループ

疾患名 食道癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 33日
 休薬日数 23日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/ 9 19:31
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day(29) | day(30) | day(31) | day(32) | day(33) | | |
|-------|--|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| Rp 06 | 静脈内注射 側注 アロキシ注 20mg 「テア」 2ml | 静注 (側管) 1 管 【暗所保存】 | | 12:45 | | | | | | |
| Rp 07 | 点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】KCL注 10mEqキット「テア」 | 点滴静注 1 袋 1 キット 【暗所保存】 | | 12:45 | | | | | | |
| Rp 08 | 点滴注射 24時間で アルモ生食 1L 5-FU注 250mg 5ml | 点滴静注 1 袋 700 mg/m ² 【冷所保存】 | | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | | | |
| Rp 09 | 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml | 点滴静注 1 瓶 -以下余白- | | | | | | | 13:45 | |

プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコル名称 【食道】 RT+CDDP (70)+5-FU (700)

同一グループ

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|------------------|
| 疾患名 | 食道癌 | 承認区分 | 承認済 |
| 診療科 | 消化器・一般外科 | 承認日時 | 2022/ 3/ 9 19:31 |
| 投薬日数 | 33日 | 承認者 | 村上 賢次 |
| 休薬日数 | 23日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 1クール | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | 村上 賢次 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | 2022/ 4/ 1 | 有効終了日 | |

| | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 ml/分 | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 ml/分 | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 ml/分 | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 ml/分 | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|-------|----|-----|-------|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| BUN | mg/dL | 以上 | Scr | mg/dL |
| | | | | 以上 |

| | | | | |
|----------------|-------|----|-----|-----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| AST | U/L | 以上 | ALT | U/L |
| T-Bil | mg/dL | 以上 | | 以上 |

| | | | | |
|----------------|-------------|----|------|-------------|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | |
| 白血球 | x百/ μ l | 以下 | リンパ球 | % |
| 好中球 | % | 以下 | 血小板 | x万/ μ l |
| ヘモグロビン | g/dL | 以下 | | 以下 |

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・CDDPと生食の総量が500mlになるよう生食の用量を修正してください。

コメント (帳票・一覧)

参考文献