

プロトコールマスター内容

3/3

発行日時 2022/4/28 20:31

プロトコール名称 【腫】 Erlonitib+GEM

同一グループ

疾患名 膀胱
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/ 8 19:55
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)					
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚糖液 5% 100ml ゲムシタビ点静注用	点滴静注 1 瓶 1000 mg/m ²		+00:15					
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:45					
		-以下余白-							

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:31

プロトコール名称 【腫】 Erlonitib+GEM

同一グループ

疾患名 膀胱
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/ 8 19:55
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)
 タルセバ (100mg/日 : 空腹時服用 : 連日投与) 併用

コメント (帳票・一覧)

参考文献