

# プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:31

1/3

プロトコール名称 【膝】 nab-PTX+GEM

同一グループ

疾患名 膝痛 承認区分 承認済  
診療科 消化器・一般外科 承認日時 2022/ 3/ 9 19:24  
投薬日数 15日 承認者 村上 賢次  
休薬日数 13日 承認取消日時  
最大クール数 無制限 承認取消者  
心機能の確認 任意 更新者 村上 賢次  
体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25	mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50	mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75	mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100	mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 x百/ $\mu$ l 以下 リンパ球 % 以下  
好中球 % 以下 血小板 x万/ $\mu$ l 以下  
ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量 (補正単位) 速度指示 day(1) day(2) day(3) day(4) day(5) day(6) day(7)

Rp 01 点滴注射 点滴静注 +00:00  
15分で 1 瓶  
大塚生食注 50ml 1 瓶  
デキサート注射液 6.6mg 2ml  
【暗所保存】

Rp 02 化学療法(薬局混合) 点滴静注 +00:15  
30分で 生食:アブラキサン溶解後空にして混  
大塚生食注 50ml 1 瓶  
アブラキサン点滴静注用 100mg 125 mg/ml  
【混注不適】 【暗所保存】

Rp 03 化学療法(薬局混合) 点滴静注 +00:45  
30分で  
大塚糖液 5% 100ml 1 瓶  
ケムシリン点滴静注用 1000 mg/ml

Rp 04 点滴注射 点滴静注 +01:15  
フラッシュ用  
大塚生食注 50ml 1 瓶

続き有り

# プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:31

2/3

プロトコール名称 【膝】 nab-PTX+GEM

同一グループ

疾患名 膝痛 承認区分 承認済  
診療科 消化器・一般外科 承認日時 2022/ 3/ 9 19:24  
投薬日数 15日 承認者 村上 賢次  
休薬日数 13日 承認取消日時  
最大クール数 無制限 承認取消者  
心機能の確認 任意 更新者 村上 賢次  
体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25	mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50	mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75	mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100	mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 x百/ $\mu$ l 以下 リンパ球 % 以下  
好中球 % 以下 血小板 x万/ $\mu$ l 以下  
ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量 (補正単位) 速度指示 day(8) day(9) day(10) day(11) day(12) day(13) day(14)

Rp 01 点滴注射 点滴静注 +00:00  
15分で 1 瓶  
大塚生食注 50ml 1 瓶  
デキサート注射液 6.6mg 2ml  
【暗所保存】

Rp 02 化学療法(薬局混合) 点滴静注 +00:15  
30分で 生食:アブラキサン溶解後空にして混  
大塚生食注 50ml 1 瓶  
アブラキサン点滴静注用 100mg 125 mg/ml  
【混注不適】 【暗所保存】

Rp 03 化学療法(薬局混合) 点滴静注 +00:45  
30分で  
大塚糖液 5% 100ml 1 瓶  
ケムシリン点滴静注用 1000 mg/ml

Rp 04 点滴注射 点滴静注 +01:15  
フラッシュ用  
大塚生食注 50ml 1 瓶

続き有り

# プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/4/28 20:31

プロトコール名称 【膝】 nab-PTX+GEM

同一グループ

疾患名	膝癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/ 9 19:24
投薬日数	15日	承認者	村上 賢次
休業日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次
体表面積 (m <sup>2</sup> )	計算式 DuBois式		
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
C C r 0~25 ml/分	%	G F R 0~25 mL/min	%	
C C r 25~50 ml/分	%	G F R 25~50 mL/min	%	
C C r 50~75 ml/分	%	G F R 50~75 mL/min	%	
C C r 75~100 ml/分	%	G F R 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

C B Cの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/ $\mu$ l	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)					
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 50ml アブラキサン点滴静注用 100mg	点滴静注 生食:アブラキサン溶解後空にして混 1 瓶 125 mg/m <sup>2</sup>		+00:15					
Rp 03	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚糖液 5% 100ml ケムシリン点滴静注用	点滴静注 1 瓶 1000 mg/m <sup>2</sup>		+00:45					
Rp 04	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15					
		-以下余白-							