

プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコル名称 【胃】 Nivo+SOX(S-1+L-OHP)

同一グループ

疾患名 胃癌
 診療科 消化器・一般外科
 承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 19:25
 投薬日数 1日
 承認者 早坂 大
 休薬日数 20日
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない
 C C r 0~25 ml/分 % G F R 0~25 mL/min %
 C C r 25~50 ml/分 % G F R 25~50 mL/min %
 C C r 50~75 ml/分 % G F R 50~75 mL/min %
 C C r 75~100 ml/分 % G F R 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
 B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前的までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml オブジーボ点滴静注	点滴静注 1 瓶 360 mg/Body 【混注不適】 【冷所保存】		+00:05					
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:35					
Rp 04	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 2 管 【暗所保存】		+00:40					
Rp 05	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚糖液 5% 500ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml エルブラット点滴静注液	点滴静注 1 袋 2 管 130 mg/m ² 【暗所保存】		+00:55					
Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+02:55					
									-以下余白-

プロトコルマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコル名称 【胃】 Nivo+SOX(S-1+L-OHP)

同一グループ

疾患名 胃癌
 診療科 消化器・一般外科
 承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 19:25
 投薬日数 1日
 承認者 早坂 大
 休薬日数 20日
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合 かけない
 C C r 0~25 ml/分 % G F R 0~25 mL/min %
 C C r 25~50 ml/分 % G F R 25~50 mL/min %
 C C r 50~75 ml/分 % G F R 50~75 mL/min %
 C C r 75~100 ml/分 % G F R 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
 B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前的までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)	
S-1の用量 <1.25m ² 80mg/日 1.25<-1.5m ² 100mg/日 ≥1.5m ² 120mg/日 Day1-14 (Day1夕食後より服用開始)	
コメント (帳票・一覧)	
参考文献	